

# LADY AMARILLA

## Teeltadvies consumptie



Gebruik: Frites

### Eigenschappen:

Rijptijd	7.5
Schilkleur	DG
Vleeskleur	7.5
Knolvorm	LO/O
Ogen	8
Regelmaat knol	7.5
Grootte knol	7.5
Sortering	7.5
Drogestof gehalte	22.5
Cons. kwaliteit	7BC
Kiemrust	8


Toelichting:  
 9 = gunstig . . . . . 1 = ongunstig  
 Vleeskleur: 8 = geel . . . . . 4 = wit  
 Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood  
 Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang  
 Kooktype: A = vast . . . . . D = zeer melig

### Plantafstand:

Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare (x 1000)
28/35	31	43,0
35/50	40	33,3
35/55	42	31,7

### Bemestingsadvies (kg/ha):


afhankelijk van de bodemvoorraad



Stikstof:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totaal
Fosfaat:	(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	110			50		25				275
Kali:	(K <sub>2</sub> O)	230									230

Om gebrek aan spoorelementen te voorkomen, deze tijdig toedienen ( B, Mg,Mn, S)

### Bewaring:



5 °C  
9 maanden

### Resistentie:

Bladrol	7
A-virus	8
X-virus	8
Y-virus	6
Yntn-virus	7
Phytophthora loof	4.5
Wratziekte	r1
Aardappelmoetheid	-
Schurft	5.5
Kringerigheid	8
Stootblauw	9
Doorwas	8

Toelichting:  
 R = resistent .... 1 = zeer vatbaar  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (w) r1 = (weinig vatbaar) resistent wratziekte fysio 1

Gevoelig voor Alternaria, begin daarom vroeg in seizoen met bestrijding.  
 Bij teelt op lichte gronden, denk aan beregening