

LADY BLANCA

Teeltadvies consumptie



Gebruik: Frites

Eigenschappen:

Rijptijd	7.8
Schilkleur	LR
Vleeskleur	4.5
Knolvorm	L
Ogen	8
Regelmaat knol	7
Grootte knol	7.5
Sortering	7
Drogestof gehalte	20.5
Cons. kwaliteit	7AB
Kiemrust	7


Toelichting:
9 = gunstig 1 = ongunstig
Vleeskleur: 8 = geel 4 = wit
Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang
Kooktype: A = vast D = zeer melig

Plantafstand:

Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare (x 1000)
28/35	27	49,4
35/45	34	39,2
45/50	38	35,1
50/55 CUT	30	44,4

Bemestingsadvies (kg/ha):


afhankelijk van de bodemvoorraad



Stikstof:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totaal	275
Fosfaat:	(P ₂ O ₅)	110			50		25				110
Kali:	(K ₂ O)	230									230

Om gebrek aan sporelementen te voorkomen, deze tijdig toedienen (B, Mg,Mn, S)

Bewaring:



6 °C
8 maanden

Resistentie:

Bladrol	7
A-virus	8
X-virus	8
Y-virus	5.5
Yntn-virus	7
Phytophthora loof	3.5
Wratziekte	r1
Aardappelmoehheid	-
Schurft	5
Kringerigheid	7
Stootblauw	8
Doorwas	7.5

Toelichting:
R = resistent 1 = zeer vatbaar
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(w) r1 = (weinig vatbaar) resistent wratziekte fysio 1

Lichte gronden zijn minder geschikt voor de teelt.
Gevoelig voor Alternaria, begin daarom vroeg in seizoen met bestrijding.
Let op magnesium gebrek.
Voorzichtig met Sencor, ruim voor opkomst toepassen.