

LADY BLANCA



Teeltadvies consumptie

Gebruik: Frites

Vroege frites-verwerking

Eigenschappen:

Rijptijd	7.8
Schilkleur	LR
Vleeskleur	4.5
Knolvorm	L
Ogen	8
Regelmaat knol	7
Grootte knol	7.5
Sortering	7
Drogestof gehalte	20.5
Cons. kwaliteit	7AB
Kiemrust	6.5


Toelichting:
9 = gunstig 1 = ongunstig
Vleeskleur: 8 = geel 4 = wit
Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang
Kooktype: A = vast D = zeer melig

Plantafstand:

Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare (x 1000)
28/35	30	44,4
35/45	34	39,2
35/50	36	37,0
45/50	40	33,3
50/55	42	31,7


Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



Stikstof:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totaal	250
Fosfaat:	(P ₂ O ₅)	110			50						110
Kali:	(K ₂ O)	230									230

Bewaring:



6 °C
8 maanden

Resistentie:

Bladrol	7
A-virus	8
X-virus	8
Y-virus	7
Yntn-virus	9
Phytophthora loof	3.5
Phytophthora knol	7
Wratziekte	O1
Aardappelmoehheid	-
Schurft	5
Kringerigheid	7
Stootblauw	8
Doorwas	7.5

Toelichting:

R = resistent 1 = zeer vatbaar

Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)

Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)

(ww)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

Voorzichtig met Sencor, nog weinig praktijk ervaring met Sencor.
Grote ruggen opbouwen om groen te voorkomen
Lichte gronden zijn minder geschikt voor de teelt.