

LADY CHRISTL



Teeltadvies consumptie

Gebruik: Tafelaardappel
Vroeg met mooie schil

Eigenschappen:

Rijptijd	8.5
Schilkleur	G
Vleeskleur	7
Knolvorm	LO
Ogen	9
Regelmaat knol	8
Grootte knol	7
Sortering	7
Drogestof gehalte	18.5
Cons. kwaliteit	8A/AB
Kiemrust	4.5


Toelichting:
9 = gunstig 1 = ongunstig
Vleeskleur: 8 = geel 4 = wit
Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang
Kooktype: A = vast D = zeer melig

Plantafstand:

Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare (x 1000)
28/35	20	66,7
35/45	27	49,4
35/50	29	46,0
45/50	31	43,0
50/55	34	39,2


Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



Stikstof:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totaal	250
Fosfaat:	(P ₂ O ₅)	110									110
Kali:	(K ₂ O)	230									230

Bewaring:



5 °C
6 maanden

Resistentie:

Bladrol	7
A-virus	9
X-virus	7
Y-virus	9
Yntn-virus	R
Phytophthora loof	2.5
Phytophthora knol	8
Wratziekte	O1
Aardappelmoetheid	Ro1
Schurft	7.5
Kringerigheid	6
Stootblauw	6.5
Doorwas	7.5

Toelichting:
R = resistent 1 = zeer vatbaar
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(ww)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

Gevoelig voor de volle dosering Sencor voor opkomst.
Niet voorkiemen
Voorkom aantasting door Rhizoctonia
Op lichtere, weinig naleverende grond kan derde N-gift zinvol zijn.
Let op magnesium gebrek.
Goed laten afharderen voor het rooien
Pas op voor zilverschurft
Voorzichtig zijn met kiemremmersmiddel bij inschuren !