LADY FELICIA

Teeltadvies consumptie

Gebruik: Tafelaardappel

Eigenschappen:

Rijptijd	7.5
Schilkleur	G
Vleeskleur	7.5
Knolvorm	O
Ogen	7.5
Regelmaat knol	9
Grootte knol	7
Sortering	9
Drogestof gehalte	19.5
Cons. kwaliteit	8B
Kiemrust	8

Toelichting:
9 = gunstig . . . . 1 = ongunstig
Vleeskleur: 8 = geel . . . . 4 = wit
Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang
Kooktype: A = vast . . . . D = zeer melig

Plantafstand:

Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare (x 1000)
28/35	19	70,2
35/45	26	51,3
35/50	27	49,4
45/50	31	43,0
50/55	33	40,4
50/60	35	38,1

Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



				Totaal
Stikstof:	(N)	200	50	250
Fosfaat:	(P_2O_5)	110		110
Kali:	(K_2O)	230		230

Bewaring:



4 °C
7 maanden

Resistentie:

Bladrol	5
A-virus	9
X-virus	7
Y-virus	9
Yntn-virus	R
Phytophthora loof	2.5
Phytophthora knol	8
Wratziekte	-
Aardappelmoeheid	Ro1,4
Schurft	7.5
Kringerigheid	7.5
Stootblauw	7
Doorwas	8

Toelichting:
R = resistent .... 1 = zeer vatbaar
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

Gebruik geen Sencor
Pootgoed goed los laten komen
Voorkom te sterke kieming
Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding
Goed laten afharden voor het rooien
Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren

C. Meijer B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.