

# LADY ROSETTA



## Teeltadvies consumptie

Gebruik: Chips

### Eigenschappen:

Rijptijd	7
Schilkleur	R
Vleeskleur	6
Knolvorm	R
Ogen	6
Regelmaat knol	8.5
Grootte knol	7
Sortering	8.5
Drogestof gehalte	25
Cons. kwaliteit	7C
Kiemrust	5.5


Toelichting:  
 9 = gunstig . . . . . 1 = ongunstig  
 Vleeskleur: 8 = geel . . . . . 4 = wit  
 Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood  
 Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang  
 Kooktype: A = vast . . . . . D = zeer melig

### Plantafstand:

Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare ( x 1000)
25/28	16	83,3
28/35	19	70,2
35/50	27	49,4
35/55	29	46,0
50/55	33	40,4
50/60	35	38,1
55/60	40	33,3


### Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



Stikstof:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totaal
Fosfaat:	(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	110									275
Kali:	(K <sub>2</sub> O)	230									330
						75					

### Bewaring:



8 °C  
4 maanden

### Resistentie:

Bladrol	6
A-virus	R
X-virus	R
Y-virus	7.5
Yntn-virus	8
Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	5.5
Wratziekte	wv1
Aardappelmoetheid	Ro1,4
Schurft	6
Kringerigheid	7.5
Stootblauw	5
Doorwas	7.5

Toelichting:

R = resistent .... 1 = zeer vatbaar  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (ww)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

Pootgoed goed los laten komen  
 Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding  
 Goed laten afharden voor het rooien  
 Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren  
 Voorkom stootblauw