

# TURBO



## Teeltadvies consumptie

Gebruik: Tafelaardappel

### Eigenschappen:

Rijptijd	7.0
Schilkleur	LG
Vleeskleur	6
Knolvorm	LO
Ogen	7
Regelmaat knol	7
Grootte knol	7.5
Sortering	6.5
Drogestof gehalte	21
Cons. kwaliteit	7BC
Kiemrust	6


Toelichting:  
9 = gunstig . . . . . 1 = ongunstig  
Vleeskleur: 8 = geel . . . . . 4 = wit  
Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood  
Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang  
Kooktype: A = vast . . . . . D = zeer melig

### Plantafstand:

Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare (x 1000)
28/35	19	70,2
35/45	27	49,4
35/50	29	46,0
35/55	30	44,4
45/50	31	43,0
50/55	34	39,2


### Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



Stikstof:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totaal	250
Fosfaat:	(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	110									110
Kali:	(K <sub>2</sub> O)	230									230

### Bewaring:



5 °C  
7 maanden

### Resistentie:

Bladrol	4
A-virus	7.5
X-virus	6
Y-virus	6.5
Yntn-virus	8
Phytophthora loof	4.5
Phytophthora knol	8
Wratziekte	O1
Aardappelmoehheid	Ro1,2,3
Schurft	7
Kringerigheid	5.5
Stootblauw	8
Doorwas	5

### Toelichting:

R = resistent .... 1 = zeer vatbaar  
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
(ww)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

Goed voorkiemen  
Voorkom aantasting door Rhizoctonia  
Niet vroeg poten in koude grond  
Gevoelig voor de volle dosering Sencor voor opkomst.